Hypromellose 0.32%

Sterile eye drops, single-dose container

Category

Artificial Tears (Ophthalmic lubricant)

Composition

Hypromellose 0.32% is a colorless, sterile clear topical solution for ophthalmic use.

Each 0.5 mL contains 1.6 mg of Hypromellose as active ingredient. Five vials will be covered with aluminum foil and six of aluminum foil pouches (30 vials) are packed in carton boxes along with leaflet.

This product is preservative free

Indications

Hypromellose 0.32% acts as a lubricant and artificial tear in the symptomatic treatment of dryness and eye irritation due to environmental factors, long-term computer use, or in some eye surgeries and inflammations.

Consumer Information Use

This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.

Contraindications

Discontinue and contact physician or pharmacist if hypersensitivity to ingredients of this product.

Warnings and precautions

- For topical ophthalmic use only.
- Discontinue and contact physician or pharmacist if pain, changes in vision, continued redness or irritation of the eye or if the condition worsens or persists for more than 72 hours.
- This product is sterile until first opening, so it is important to keep the drops as clean as possible during use. Avoid touching the dropper to eyelids or to other surfaces.
- If more than one ophthalmic product is used, allow an interval of at least 5-15 minutes between applications. Hypromellose drops should be applied last.
- This product does not contain preservatives and is suitable for patients who are hypersensitive to preservatives and wear soft contact lens.
- This product is preservative free, so which should be thrown away immediately after use.
- Keep the medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use after the expiry date which is stated on the label. The expiry date refers to the last day of that month.
- Do not use if the single-dose container is damaged or contains visible particulate matter.


Dosage and Administration

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your physician or pharmacist have told you.

The recommended dose is instilled one or two drops into each eye three to five times a day. If necessary, use more frequently as prescribed your physician or pharmacist. If you forget to use the drops at your usual time, do not worry, just put them in when you remember. Do not double up the number of drops you use to make up for forgetting to use them.

How to use Single Use Sterile Eye Drops

1. Wash your hands thoroughly then open foil pouch (figure 1).
2. Holding the unit, remove a vial from the strip (figure 2).
3. Twist the cap off vial (figure 3).
4. Tilt head backward, pull down the lower eyelid with your forefinger downwards to form a pocket (figure 4).
5. Hold the drop upside down near your eye. Avoid touching your eye or eyelids. Apply enough pressure to release one drop into the eye. Only use a second drop if the first one misses the eye (figure 4).
6. Close your eyes for one or two minutes.
7. Repeat the process in the other eye if instructed.
8. Discard the vial immediately after use.



Pregnancy and Lactation

Problems in humans have not been documented. However, consult your doctor or pharmacist before taking any medication.

Adverse Reactions

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Adverse Reactions are transient mild stinging and temporary blurred vision upon instillation. There is a slight possibility that irritation and itching of the eye may occur in some people

If any side effect gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please discontinue and contact physician or pharmacist.

Storage

- Store below 30°C and protect from light and freezing.
- Keep the single-dose container in the original aluminum pouch to protect from light and contamination.
- After using single-dose container, throw it away.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer
niki sam Pharma Mashhad Iran
Tel: 051-35000111
Fax: 051-35423100
Email: info@nikisampharma.com
This leaflet was last revised in 03/2026

References

- Joint Formulary Committee. British National Formulary. 71st ed. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press; 2016.
- Ophthalmic Drug Facts, 25 Edition

niki sam Pharma

هایپرومـلـوز ۰/۳۲ درصـد

قطره استریل چشمـی یک‌بـار مصرف

دسته دارویی

اشک مصنوعی (روان‌کننده چشمی)

مشخصات دارو

هایپرومـلـوز ۰/۳۲ درصـد یـک محلول اسـتریل، شـفاف و بی‌رنگ اسـت که برای اسـتفاده موضعـی در چشـم بـه کار مـی‌رود. هـر ۰/۵ میلی‌لیتـر از ایـن محلـول حـاوی ۱/۶ میلی‌گـرم هایپرومـلـوز می‌باشـد.

هر ۵ ویال در یک لفاف آلومینیومی بسـته‌بندی شـده و ۶ عدد از این بسـته‌بندی (۳۰ عدد ویال) در درون جعبه مقوایی همراه با بروشـور عرضه می‌شـود.

این فرآورده فاقد مواد نگهدارنده است.

موارد مصرف دارو

ایـن فـرآورده به عنوان اشـک مصنوعی بـا خاصیت رطوبت‌رسـانی و روان‌کنندگی، بـرای کاهـش خشـکی و تحریک‌پذیـری چشـم ناشـی از عوامل محیطی، اسـتفاده طولانـی مـدت از رایانـه و همچنیـن بـرای تسـکین علائـم خشـکی چشـم پـس از جراحی‌هـای چشـمی و در التهاب‌هـای سـطحی چشـم تجویـز می‌شـود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار

ایـن دارو بـرای بیماری فعلی شـما تجویز شـده اسـت. لذا از مصـرف آن در موارد مشـابه یـا توصیه به دیگـران جداً خـودداری نمایید.

موارد منـع مصرف

در صـورت هـر گونـه حساسـیت نسـبت بـه هـر یـک از ترکیبـات موجـود در این دارو بـا پزشـک خـود مشـورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات در زمان مصرف


- این دارو فقط برای مصرف موضعی چشمی می‌باشد.
- در صورت بروز درد، قرمزی، سوزش مداوم یا تغییر در بینایی که بیش از ۷۲ ساعت ادامه یابد یا شدت پیدا کند، مصرف دارو باید قطع شود و بیمار باید به پزشک مراجعه نماید.
- این دارو تا پیش از بازشدن، استریل است. هنگام مصرف باید دقت شود که نوک ویال با انگشتان یا هر سطح دیگری تماس پیدا نکند. همچنین از تماس نوک ویال با پلک ها خودداری شود.
- اگر از فرآورده‌های چشمی دیگری استفاده می‌کنید، بین هر بار استفاده، ۵ تا ۱۵ دقیقه فاصله بگذارید. معمولا توصیه می شود که در بین قطره‌ها آخر از هایپرومولوز استفاده کنید.
- از آنجا که این دارو فاقد مواد نگهدارنده است، برای بیماران حساس به مواد نگهدارنده و افرادی که از لنزهای تماسی نرم استفاده می‌کنند مناسب می‌باشد.
- این دارو به صورت تک‌دوز عرضه شده است، بنابراین باید بلافاصله پس از باز کردن و مصرف، ویال را دور بیندازید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پیش از مصرف، از سالم بودن ویال اطمینان حاصل نمایید. در صورت مشاهده کدورت، ذرات معلق یا تاریخ انقضای گذشته، از مصرف دارو خودداری نمایید.

مقدار و چگونگی مصرف

مقـدار مصـرف هـر دارو را پزشـک تعییـن می‌نمایـد. مقـدار مصرف معمـول دارو، یـک قطـره در هـر چشـم، ۳ تـا ۵ بـار در روز اسـت. در صـورت نیـاز پزشـک می‌توانـد دفعـات مصـرف را افزایـش دهـد.

در صـورت فرامـوش نمـودن یـک نوبـت مصـرف، دارو بایـد بـه محـض یـادآوری اسـتفاده شـود. چنانچـه زمـان مصـرف نوبـت بعـدی نزدیـک باشـد، نوبـت فرامـوش شـده نبایـد مصـرف گـردد و بیمـار بایـد برنامـه درمانـی خـود را طبـق روال معمـول ادامـه دهـد. مصـرف همزمـان دو دوز از دارو توصیـه نمی‌شـود.

روش صحیح استفاده از قطره‌های چشمی یکبار مصرف



۱. ابتدا دسـت‌های خود را کاملاً بشـویید و سپس لفاف آلومینیومی را باز کنید (شـکل ۱).

۲. قسـمت انتهایـی ویـال را مطابـق شـکل جدا کنیـد (شـکل ۲).

۳. درپـوش ویـال را بچرخانیـد و از بدنـه جـدا کنیـد (شـکل ۳).

۴. سـر خـود را کمـی بـه عقـب خـم کـرده و بـه سـمت بـالا نـگاه کنید. با انگشـت خـود پلک پایین را بـه آرامـی پایین بکشـید تـا حفره‌ای ایجاد شـود (شـکل ۴).

۵. یـک قطـره از دارو را درون حفـره پلـک پایین بچکانیـد. در صورتـی کـه قطـره وارد چشـم نشـد، مجـدداً یک قطـره دیگر اسـتفاده کنید. (شکل ۴)

۶. پـس از مصـرف دارو، چشـم‌ها را بـه مـدت یـک تـا دو دقیقـه ببندیـد.

۷. در صورتـی کـه مصرف دارو برای هر دو چشـم توصیـه شـده اسـت، همیـن مراحـل را بـرای چشـم دیگر نیـز تکـرار نمایید.

۸. پـس از پایـان مصـرف، ویـال استفاده‌شـده بایـد دور انداختـه شـود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصـرف ایـن دارو در دوران بـارداری و شـیردهی بلامانـع اسـت، بـا ایـن حـال توصیه می‌شـود پیـش از مصـرف دارو در ایـن دوران بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت نمایید.

عوارض جانبی دارو

هـر دارو بـه مـوازات اثرات درمانی ممکن اسـت باعث بروز بعضی عوارض ناخواسـته نیـز شـود. اگرچـه همـه ایـن عـوارض در یـک فـرد دیـده نمی‌شـود در صـورت بـروز عـوارض زیـر یـا افزایـش شـدت علائـم با پزشـک یـا داروسـاز مشـورت نمایید.

شـایع‌ترین عارضـه جانبـی این دارو، احسـاس سـوزش خفیف و گذرای چشـم در هنـگام اسـتفاده اسـت. ممکـن اسـت بلافاصلـه پـس از مصـرف دارو، تـاری دید موقـت ایجـاد شـود کـه معمولاً ظرف چنـد دقیقه برطـرف می‌گـردد. در برخی افراد نیـز احتمـال بروز خـارش یا تحریک چشـم وجـود دارد.

شرایط نگهداری

- دارو را در دمـای کمتـر از ۳۰ درجـه سـانتی‌گراد و دور از نـور نگهـداری و از یخزدگـی محافظـت نماییـد.
- ویال‌ها باید تا هنگام مصرف در لفاف آلومینیومی اصلی خود نگهداری شوند.
- از آنجـا کـه ایـن فرآورده فاقـد مواد نگهدارنده اسـت، ویال بایـد بلافاصله پس از بازشـدن مصـرف گـردد و از نگهداری یا اسـتفاده مجدد آن خودداری شـود.

دارنده پروانه ساخت و تولید کننده

نیکی سام فارما مشهد- ایران

تلفن: ۰۵۱-۳۵۰۰۰۱۱۱

فکس: ۰۵۱-۳۵۴۲۳۱۰۰

ایمیل : info@nikisampharma.com

این برگه راهنما آخرین بار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱ مورد بازنگری قرار گرفته است.

منابع علمی

- Joint Formulary Committee. British National Formulary. 71st ed. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press; 2016.
- Ophthalmic Drug Facts, 25 Edition

niki sam Pharma

HP: 178874-0.xxxxxxx B:xxxxxxx

Hoodis Pars Print & Design

Name:	**Leaflet Hypromellose**
Edit:	**08**
Date:	**20.02.1405**
Hoodis Code:	**HP.178874-0.**
Size:	**148 x 210 mm**

PANTONE 286 C
PANTONE 298 C
PANTONE 354 C

لطفا موارد زیر را با دقت بررسی و در صورت عدم ایراد، تایید بفرمایید.

۱. اطلاعات متن بروشور (تخصصی- نگارشی، علایم و جدول ها)
۲. طراحی گرافیک
۳. تطابق اطلاعات درج شده در شناسنامه
(نام کار، تاریخ، شماره ادیت، کد هودیس، ابعاد و کد و تعداد رنگ‌ها)