Sodium Hyaluronate

0.15%, 0.2%, 0.3% and 0.4%

sterile eye drops, single-dose container

Category

Artificial tears, Eye lubricant

Composition

Sodium Hyaluronate is a colorless, sterile clear topical solution for ophthalmic use.

Each 0.5 mL of Sodium Hyaluronate 0.15%, 0.2%,0.3% and 0.4% contains 0.75, 1, 1.5 and 2 mg of Sodium hyaluronate as active ingredient respectively. Each five single-dose containers covered with aluminum foil and 30 vials are packed in carton boxes along with leaflet.

This product is a preservative free.

Indications

Sodium hyaluronate eye drops help maintain natural ocular moisture by lubricating and hydrating the eye surface, thereby relieving dryness, irritation, and fatigue caused by prolonged computer use, television viewing, or exposure to dry air condition. It may also be used to maintain ocular surface moisture in cases of reduced tear secretion or following ocular surgery.

Consumer Information Use

Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.

Contraindications:

Discontinue and contact physician or pharmacist if hypersensitivity to ingredients of this product.

Warnings and precautions

- For topical ophthalmic use only.
- Discontinue and contact physician or pharmacist if pain, changes in vision, continued redness or irritation of the eye, or if the condition worsens or persists for >72 hr.
- This product is sterile until first opening, so it is important to keep the drops as clean as possible during use. Avoid touching the dropper to eyelids or to other surfaces.
- If you are using any other eye products leave 5-15 minutes between applying each one.
- This product does not contain preservatives and is suitable for patients who are hypersensitive to preservatives and wear soft contact lens.
- This product is preservative free, so which should be thrown away immediately after use.
- Keep the medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use after the expiry date which is stated on the label. The expiry date refers to the last day of that month.
- Do not use if the single-dose container is damaged or contains visible particulate matter.


Dosage and Administration

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your physician or pharmacist have told you. Check with your physician or pharmacist if you are not sure.

The recommended dose is instilled one or two drop(s) into each eye three to five times a day. If necessary, use more frequently as prescribed your physician or pharmacist. If you forget to use the drops at your 'usual' time, do not worry, just put them in when you remember. Do not 'double up' the number of drops you use to make up for forgetting to use them.

How to use Single-dose container, Sterile Eye Drops

1. Wash your hands thoroughly then open foil pouch (figure 1).
2. Holding the unit, remove a vial from the strip (figure 2).
3. Twist the cap off vial (figure 3).
4. Tilt head backward, pull down the lower eyelid with your forefinger downwards to form a pocket (figure 4).
5. Hold the drop upside down near your eye. Avoid touching your eye or eyelids. Apply enough pressure to release one drop into the eye. Only use a second drop if the first one misses the eye (figure 4).
6. Close your eyes for one or two minutes.
7. Repeat the process in the other eye if instructed.
8. Discard the vial immediately after use.



Pregnancy and Lactation

Problems in humans has not been documented. However, consult your doctor or pharmacist before taking any medication.

Adverse Reactions

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Adverse Reactions are transient mild stinging and temporary blurred vision upon instillation. There is a slight possibility that irritation and itching of the eye may occur in some people.

If any side effect gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please discontinue and contact physician or pharmacist.

Storage

- Store below 30 °C and protect from light and freezing.
- Keep the single-dose container in the original aluminum pouch to protect from light and contamination.
- After using single-dose container, throw it away.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer
niki sam Pharma Mashhad Iran
Tel: 051-35000111
Fax: 051-35423100
Email: info@nikisampharma.com
This leaflet was last revised in 03/2026

References

- Joint Formulary Committee. British National Formulary. 71st ed. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press; 2016.
- Ophthalmic Drug Facts, 25 Edition

niki sam Pharma

سدیم هیالورونات

۰/۱۵ درصد، ۰/۲ درصد، ۰/۳ درصد و ۰/۴ درصد

قطره استریل چشمی یکبار مصرف

دسته دارویی

اشک مصنوعی (مرطوب کننده چشمی)

مشخصات دارو

سدیم هیالورونات به صورت محلول استریل، شفاف و بی‌رنگ جهت مصرف موضعی در چشم در چهار غلظت موجود است:

۰/۱۵ درصد (هر ویال حاوی ۰/۷۵ میلی‌گرم سدیم هیالورونات در ۰/۵ میلی‌لیتر محلول)

۰/۲ درصد (هر ویال حاوی ۱ میلی‌گرم سدیم هیالورونات در ۰/۵ میلی‌لیتر محلول)

۰/۳ درصد (هر ویال حاوی ۱/۵ میلی‌گرم سدیم هیالورونات در ۰/۵ میلی‌لیتر محلول)

۰/۴ درصد (هر ویال حاوی ۲ میلی‌گرم سدیم هیالورونات در ۰/۵ میلی‌لیتر محلول)

هر ۵ ویال در یک لفاف آلومینیومی بسته‌بندی شده و ۶ عدد از این بسته‌بندی (۳۰عدد ویال) در درون جعبه مقوایی همراه با بروشور عرضه می‌شود.

این فرآورده فاقد مواد نگهدارنده است.

موارد مصرف دارو

این فرآورده به عنوان اشک مصنوعی جهت تسکین علائم خشکی چشم از جمله سوزش، احساس جسم خارجی، خارش و خستگی چشم ناشی از عوامل مختلف مانند کار طولانی مدت با کامپیوتر، تماشای صفحه‌نمایش، قرار گرفتن در معرض باد، آلودگی یا هوای خشک به‌کار می‌رود. همچنین در موارد کاهش ترشح اشک یا پس از جراحی‌های چشمی جهت حفظ رطوبت سطح چشم استفاده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

موارد منع مصرف

در صورت هر گونه حساسیت نسبت به هر یک از ترکیبات موجود در این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات در زمان مصرف

- این دارو فقط برای مصرف موضعی چشمی می‌باشد.
- در صورت بروز درد، قرمزی، سوزش مداوم یا تغییر در بینایی که بیش از ۷۲ ساعت ادامه یابد یا شدت پیدا کند، مصرف دارو باید قطع شود و بیمار باید به پزشک مراجعه نماید.
- این دارو تا پیش از باز شدن، استریل است. هنگام مصرف باید دقت شود که نوک ویال یا انگشتان یا هر سطح دیگری تماس پیدا نکند. همچنین از تماس نوک ویال با پلک‌ها خودداری شود.
- اگر از فرآورده چشمی دیگری استفاده می‌کنید، بین هر بار استفاده بین ۵ تا ۱۵ دقیقه فاصله بگذارید.
- از آنجا که این دارو فاقد مواد نگهدارنده است، برای بیماران حساس به مواد نگهدارنده و افرادی که از لنزهای تماسی نرم استفاده می‌کنند مناسب می‌باشد.
- این دارو به‌صورت تک‌دوز عرضه شده است بنابراین باید بلافاصله پس از باز کردن و مصرف، ویال را دور بیندازید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پیش از مصرف، از سالم بودن ویال اطمینان حاصل نمایید. در صورت مشاهده کدورت، ذرات معلق یا تاریخ انقضا گذشته، از مصرف دارو خودداری نماید.

مقدار و چگونگی مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید. مقدار مصرف معمول دارو، یک قطره در هر چشم، سه تا پنج بار در روز است. در صورت نیاز، پزشک می‌تواند دفعات مصرف را افزایش دهد.

در صورت فراموش نمودن یک نوبت مصرف، دارو باید به‌محض یادآوری استفاده شود. چنانچه زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک باشد، نوبت فراموش‌شده نباید مصرف گردد و بیمار باید برنامه درمانی خود را طبق روال معمول ادامه دهد. مصرف هم‌زمان دو دوز از دارو توصیه نمی‌شود.

روش صحیح استفاده از قطره‌های چشمی یکبار مصرف

۱. ابتدا دست‌های خود را کاملاً بشویید و سپس لفاف آلومینیومی را باز کنید (شکل ۱).



۲. قسمت انتهایی ویال را مطابق شکل جدا کنید (شکل ۲).



۳. درپوش ویال را بچرخانید و از بدنه جدا کنید (شکل ۳).



۴. سر خود را کمی به عقب خم کرده و به سمت بالا نگاه کنید. با انگشت خود پلک پایین را به‌آرامی پایین بکشید تا حفره‌ای ایجاد شود (شکل ۴).



۵. یک قطره از دارو را درون حفره پلک پایین بچکانید. در صورتی که قطره وارد چشم نشود، مجدداً یک قطره دیگر استفاده کنید (شکل ۴).

۶. پس از مصرف دارو، چشم‌ها را به مدت یک تا دو دقیقه ببندید.

۷. در صورتی که مصرف دارو برای هر دو چشم توصیه شده است، همین مراحل را برای چشم دیگر نیز تکرار نمایید.

۸. پس از پایان مصرف، ویال استفاده‌شده باید دور انداخته شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی بلامانع است. با این حال، توصیه می‌شود پیش از مصرف دارو در این دوران با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی دارو

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود در صورت بروز عوارض زیر یا افزایش شدت علائم با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

شایع ترین عارضه جانبی این دارو سوزش مختصر و گذرای چشم هنگام مصرف دارو است. تاری دید که بلافاصله بعد از مصرف ایجاد می‌شود تا چند دقیقه برطرف می‌گردد. احتمال بروز سوزش و خارش چشم در بعضی افراد وجود دارد.

شرایط نگهداری

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری و از یخزدگی محافظت نمایید.
- ویال‌ها باید تا هنگام مصرف در لفاف آلومینیومی اصلی خود نگهداری شوند.
- از آنجا که این فرآورده فاقد مواد نگهدارنده است، ویال باید بلافاصله پس از باز شدن مصرف گردد و از نگهداری یا استفاده مجدد آن خودداری شود.

دارنده پروانه ساخت و تولید کننده

نیکی سام فارما مشهد- ایران

تلفن: ۰۵۱-۳۵۰۰۰۱۱۱

فکس: ۰۵۱-۳۵۴۲۳۱۰۰

ایمیل : info@nikisampharma.com

این برگه راهنما آخرین بار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱ مورد بازنگری قرار گرفته است.

منابع علمی

- Joint Formulary Committee. British National Formulary. 71st ed. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press; 2016.
- Ophthalmic Drug Facts, 25 Edition

HP. 178877-0.xxxxxxx B.xxxxxx

Hoodis Pars Print & Design

Name:	**Leaflet Sodium Hyaluronate**
Edit:	**06**
Date:	**28.02.1405**
Hoodis Code:	**HP.178877-0.**
Size:	**148 x 210 mm**

PANTONE 286 C
PANTONE 298 C
PANTONE 354 C

لطفا موارد زیر را با دقت بررسی و در صورت عدم ایراد، تایید بفرمایید.

۱. اطلاعات متن بروشور (تخصصی- نگارشی، علایم و جدول ها)
۲. طراحی گرافیک
۳. تطابق اطلاعات درج شده در شناسنامه
(نام کار، تاریخ، شماره ادیت، کد هودیس، ابعاد و کد و تعداد رنگ‌ها)